

NUEVO

Rogastril[®] H2

CINITAPRIDA RANITIDINA

Tratamiento de la
dispepsia funcional
de tipo ácida



1 COMPRIMIDO 15 MINUTOS
ANTES DE CADA COMIDA PRINCIPAL
(almuerzo y cena)

PRESENTACIONES: ROGASTRIL H2 (RANITIDINA 150 MG + CINITAPRIDA 1 MG), ENVASES DE 10 Y DE 30 COMPRIMIDOS.

OTRAS PRESENTACIONES

Rogastril: Envases de 10 y de 30 comprimidos - **Rogastril Solución:** Envase de 90 ml
Rogastril Plus: Envases de 15 y de 30 comprimidos - **Rogastril Plus Suspensión:** Frasco de 90 ml

Rogastril
CINITAPRIDA

Rogastril
CINITAPRIDA SIMETICONA **plus**

Rogastril
CINITAPRIDA SIMETICONA **plus** MASTICABLE



NUEVO

Rogastril[®] H2

CINITAPRIDA RANITIDINA

Tratamiento de la
dispepsia funcional
de tipo ácida



NUEVO

Rogastril H2

CINITAPRIDA RANITIDINA

NUEVA ASOCIACIÓN PARA TRATAR
LA DISPEPSIA FUNCIONAL DE TIPO ÁCIDA

CINITAPRIDA


Procinético para el aparato gastrointestinal con una marcada acción procolinérgica mediante el bloqueo de los receptores presinápticos para la serotonina (5HT4).



RANITIDINA

Inhibidor reversible de los receptores histamínicos **H2** de las células parietales del estómago, con una consecuente disminución de la secreción ácida gástrica tanto basal como provocada por diversos estímulos.

Una combinación potente, efectiva y segura




1 COMPRIMIDO 15 MINUTOS
ANTES DE CADA COMIDA PRINCIPAL
(almuerzo y cena)



EFICACIA CLÍNICA DE ROGASTRIL H2
en el tratamiento de la dispepsia funcional de tipo ácida
en comparación con el placebo. ¹

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE RESPUESTA PARA LAS DOS RAMAS



Distribución porcentual de respondedores por rama según **GOS semana 1** y **GOS semana 2**.

1- Evaluación Clínica de una Asociación Fija en Comprimidos Recubiertos de ROE-3629 Controlada con Placebo en Pacientes con Dispepsia Funcional Leve a Moderada. Análisis Estadístico Final. (Versión Marzo 2017). Aprobado por ANMAT.